

## MEZCLA CAÍNAS

Es una mezcla de anestésicos locales del grupo de ésteres del ácido paraaminobenzoico: cincocaína cloruro, ametocaína cloruro y benzocaína.

Se utiliza para detectar sensibilización a estos medicamentos en pruebas epicutáneas.

### USOS

- Medicamentos: Inyectables, tabletas o sprays para dolores de boca o garganta, picaduras de insectos, erupciones cutáneas. Preparados para hemorroides y colirios, supositorios. Antitusígenos.
- Medicamentos para uso veterinario
- Adhesivos para paladares postizos
- Cosméticos

### REACCIÓN CRUZADA

- |              |                         |                 |
|--------------|-------------------------|-----------------|
| - Procaína   | - Ortocaína (Ortoformo) | - Cloroprocaína |
| - Butetamina | - Neo-orthoformo        | - Risocaína     |
| - Tetracaína | - Parafenilendiamina    | - Novocaína     |
| - Butacaína  | - Procainamida          | - Cincocaína    |
| - Meapaína   | - Proparacaína          |                 |

### EVITACIÓN

- Evite el contacto con las fuentes de exposición descritas anteriormente.
- Advierta a sus médicos, dentistas y farmacéuticos que es alérgico a estos medicamentos.
- Utilice medicamentos con productos alternativos a estos anestésicos locales, como los del grupo amida (lidocaína, prilocaina, bupivacaína, mepivacaína....)